

## ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO ORTOPEDIA

Rev. 2 del 06/12/2023  
Pag. 1/ 2

### INDICAZIONI PER COME ESEGUIRE LA MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA

#### **Materiale necessario:**

- **Guanti in vinile**
- **Il disinfettante** a base di clorexidina (qualsiasi marca va bene)
- **La soluzione fisiologica** serve per pulire la ferita prima di applicare il disinfettante
- **Batuffoli di garza sterile o garze sterili piegate** da usare per la disinfezione

Le mani sono il maggior veicolo di trasmissione delle infezioni, un buon lavaggio delle mani rappresenta il miglior modo per proteggersi, pertanto è indispensabile farlo ogni volta che ci si accinge a medicare la ferita: lavare bene, con acqua e sapone, mani e polsi, per almeno tre minuti prestando attenzione anche alla pulizia approfondita delle unghie. Asciugare accuratamente utilizzando preferibilmente materiale monouso.

Indossare quindi i guanti monouso su entrambe le mani

#### **Metodica:**

1. togliere la medicazione tirando con delicatezza ma in modo deciso, qualora le garze fossero attaccate alla ferita, inumidirle con il disinfettante ed attendere qualche minuto prima di proseguire
2. buttare il materiale rimosso nel contenitore dei rifiuti o comunque allontanarlo dalla ferita
3. lavare accuratamente la ferita con soluzione fisiologica
4. prendere un batuffolo di garza sterile e tenendolo da un angolo spruzzare nella superficie il disinfettante senza toccarlo con il flacone; passare il batuffolo sulla ferita con movimenti che vanno dal centro della ferita verso l'esterno. Questo impedisce di trascinare i microbi normalmente presenti sulla pelle sana verso la ferita
5. Con un secondo batuffolo procedere all'asciugatura, sempre nel medesimo modo. L'asciugatura è un passaggio importante perché se la pelle restasse bagnata la nuova medicazione potrebbe staccarsi e favorire così il proliferare di batteri
6. Posizionare a contatto con la ferita una garza sterile e far aderire il nuovo cerotto

#### **Frequenza della medicazione:**

Questa procedura deve essere ripetuta ogni 3-4 giorni, salvo che la garza si sporchi per la fuoriuscita di sangue o altro materiale

La ferita deve rimanere coperta fino alla rimozione dei punti e completa guarigione



## **ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO** **ORTOPEDIA**

**Rev. 2 del 06/12/2023**  
**Pag. 2/ 2**

### **Cosa non fare:**

Toccare la ferita con le mani nude,

Grattare per rimuovere la pelle morta o le Escare (crosticine): cadranno spontaneamente dopo 15/20gg circa dall'intervento

Fare la doccia o il bagno con la ferita non guarita

Lasciare sulla ferita una medicazione bagnata/umida

Contatto con animali domestici fino a completa guarigione

Sforzi e attività che provocano abbondante sudorazione della pelle (se accade effettuare subito dopo una nuova medicazione)

frequentare luoghi troppo affollati, con molta polvere o poco sanificati

utilizzare mezzi pubblici se non strettamente necessario

NB: Se insorgono i seguenti sintomi: Rossore-gonfiore-dolore-perdita della funzionalità-materiale purulento contattare subito l'ambulatorio e/o il Medico di Medicina Generale

### **Controlli:**

Per la rimozione punti, dopo circa 20gg programmare un appuntamento presso l'ambulatorio di provenienza.

Dott. Antonello Maria Panti  
Medico Chirurgo  
Specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Dott. Alessandro Maria Panti  
Medico Chirurgo  
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

